

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	DIFENAZOX 325 SC
<i>Type de formulation</i>	SC – Suspension concentrée
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Azoxystrobine 200 g/l Difenoconazole 125g/l
<i>Usage</i>	Fongicide

DIFENAZOX 325 SC est un fongicide à large spectre pour lutter contre les maladies des cultures maraîchères et fruitières, et des céréales.

MODE D'ACTION

DIFENAZOX 325 SC contient 200 g/l d'azoxystrobine, matière active de la famille des strobilurines, groupe FRAC-11 et 125g/l de difenoconazole, matière active de la famille des triazoles, groupe FRAC-3.

L'azoxystrobine, fongicide semi-systémique, a un large spectre d'efficacité contre les quatre familles de champignons pathogènes : Ascomycètes, Basidiomycètes, Deutéromycètes et Oomycètes. Elle exerce son action au niveau des mitochondries du champignon par blocage de la respiration et arrêt de la production d'énergie. L'azoxystrobine agit sur la germination, sur la croissance mycélienne et sur la sporulation. La pénétration dans la plante se fait de façons complémentaires : translaminaire, transport par le xylème, diffusion autour du point d'impact, remise en solution par les pluies et les rosées.

Le difenoconazole, fongicide systémique à action préventive et curative, a un très large spectre d'efficacité contre les champignons pathogènes. Il agit en inhibant la synthèse des membranes cellulaires ce qui empêche le développement du champignon dans son ensemble et entraîne sa mort.

MODALITES D'EMPLOI

Stratégies conseillées

La dose préconisée est de 0.375-1 litre par hectare, à adapter en fonction des conditions locales.

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Arachide	Anthracnose Rouille, Alternariose, Cercosporiose	0.5 l/ha	Traiter dès les premiers risques d'attaque avec répétitions à intervalle de 14j. 2 appl. Max par campagne.	28j	48h
Maïs, Maïs doux, Sorgho		0.5-1 l/ha		14j	
Pois secs, Fèves		0.5 l/ha		45j	
Haricot vert		0.5 l/ha		7j	
Tomate, Piment		1 l/ha		3j	
PdT		0.375 l/ha		14j	

Traitement de base :

DIFENAZOX 325 SC s'utilise en pulvérisation foliaire classique. Remplir la cuve du pulvérisateur à moitié puis ajouter la dose adéquate de DIFENAZOX 325 SC, bien remuer, puis compléter le volume restant avec de l'eau.

Précautions

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de DIFENAZOX 325 SC selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau

Ne pas avaler ou respirer le produit.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Mesure de première urgence

Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène.

En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau claire. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes y compris sous les paupières. Consulter d'urgence un médecin si l'irritation persiste.

Ingestion : Rincer la bouche. Faire boire 1-2 verres d'eau si la victime est consciente. NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.

Antidote et équivalents

Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique.