

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	ETOILE 30 EC
<i>Type de formulation</i>	EC – Emulsion concentrée
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Etoxazole 30g/l
<i>Usage</i>	Acaricide

ETOILE 30 EC est une formulation prête à l'emploi pour le traitement par pulvérisation foliaire toutes cultures.

ETOILE 30 EC : une réponse adaptée aux exigences des filières

- Efficacité : nouvelle matière active, nouveau mode d'action, efficace même sur les souches d'acariens résistantes aux organophosphorés et avermectines
- Lutte intégrée : pas de résistance croisée avec les autres acaricides mode d'action à utiliser en alternance
- Environnement : respecte la faune auxiliaire, faible quantité de matière active à l'hectare
- Utilisation : facile d'emploi, très bonne tenue au lessivage

MODE D'ACTION

ETOILE 30 EC contient 30g/l d'etoxazole, matière active de la famille des oxazolines, groupe IRAC-10b.

ETOILE 30 EC est un acaricide foliaire qui peut être utilisé en préventif ou en curatif. Il agit par contact sur les œufs en perturbant la formation de leurs organes de respiration et sur les larves d'acariens en inhibant le processus de la mue. De plus il induit la stérilisation des femelles par une action transovarienne. Ses propriétés translaminaires lui confèrent une efficacité accrue (action sur parasites situés sous les feuilles), une grande persistance d'action (jusqu'à 2 mois) ainsi qu'une très bonne résistance au lessivage.

ETOILE 30 EC possède un mode d'action unique : il agit comme un inhibiteur de croissance chez les acariens.

MODALITES D'EMPLOI

Objectifs

Le protection phytosanitaire des cultures maraîchères, vivrières et fruitières est importante pour obtenir un niveau de rendement satisfaisant car elle sont particulièrement attractives pour les agents pathogènes et insectes parasites.

Principales cibles visées

ETOILE 30 EC permet de lutter efficacement contre les acariens. ETOILE 30 EC peut être utilisé sur les cultures maraîchères, vivrières et fruitières.

Stratégies conseillées

La dose moyenne préconisée est de 1l/ha.

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Tomate, Aubergines	Acariens	1l/ha	Traiter dès les 1ères infestations, ou dès le seuil de 3-5 formes mobiles atteint. Limite d'emploi : 1 application par campagne.	3j	8h
Melon, Pastèque, Potiron et cucurbitacées à peau comestible de plein champ					
Cultures fruitières		2l/ha		45j	

Traitement de base :

En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat d'ETOILE 30 EC et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

Précautions

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de ETOILE 30 EC selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau

Ne pas avaler ou respirer le produit.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Mesure de première urgence

Inhalation : Faire respirer de l'air frais. En cas de respiration difficile ou d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. Consulter immédiatement un médecin.

Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver immédiatement et abondamment à l'eau claire les parties exposées de la peau. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation persiste. Laver les vêtements avant réutilisation.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau y compris sous les paupières. Consulter d'urgence un médecin.

Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.

Antidote et équivalents

Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique