

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	LATEBEN 500 WP
<i>Type de formulation</i>	WP – Poudre mouillable
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Benomyl 500g/kg
<i>Usage</i>	Fongicide

LATEBEN 500 WP est un fongicide utilisé notamment pour la protection de la canne à sucre.

MODE D'ACTION

LATEBEN 500 WP contient 500g/kg de benomyl, matière active de la famille des benzimidazoles, groupe FRAC-1.

LATEBEN 500 WP est un fongicide systémique qui agit préventivement et curativement. Il se diffuse principalement de manière ascensionnelle dans la plante et possède une bonne persistance d'action.

MODALITES D'EMPLOI

Principales cibles visées

LATEBEN 500 WP agit sur les quatre familles de champignons pathogènes. On peut l'employer sur cultures maraîchères et fruitières ainsi que sur céréales.

Stratégies conseillées

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Canne à sucre	Ceratocystis paradoxa	50g/100l d'eau	A utiliser pour le trempage des boutures à froid ou à chaud (50°C).	n/a	n/a

Précautions

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de LATEBEN 500 WP selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau

Ne pas avaler ou respirer le produit.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Mesure de première urgence

Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène.

En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau claire. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes y compris sous les paupières. Consulter d'urgence un médecin si l'irritation persiste.

Ingestion : Rincer la bouche. Faire boire 1-2 verres d'eau si la victime est consciente. NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.

Antidote et équivalents

Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique.