

GROUPE
savana



Composition

Rimsulfuron : 30 g/l

Famille chimique

Sulfonyles - HRAC-2

Formulation

OD - Dispersion huileuse

Mode d'action

Contact / Systémique / Foliaire /
Racinaire

Cultures

Maïs

Cible

Adventices dicotylédones et graminées

Mode d'application

Traiter en post-levée de la culture et
des adventices, 15-25 jours après
levée.

Dose

0.5 l/ ha

RAMSES®

Herbicide complet de post-levée sélectif du maïs

- Efficace sur de nombreuses dicotylédones et graminées.
- Peu de matière active à l'hectare
- Utilisable sur toute variété de maïs
- Une nouvelle formulation OD : résistance au lessivage et efficacité renforcée

Herbicide

RAMSES®

Herbicide complet de post-levée sélectif du maïs

OBJECTIFS

Le désherbage de post-levée du maïs vise à empêcher la concurrence des adventices et de garantir un rendement optimal.

PRINCIPALES ADVENTICES VISÉES

Dicotylédones : *Celiosia argentea*, *Corchorus tridens*, *Hibiscus asper*, *Ipomoea eriocarpa*, *Ludwigia abyssinica*, *Mitracarpus villosus*, *Spermacoce ruelliae*, *Stachytarpheta angustifolia*.

Monocotylédones (graminées) : *Brachiaria deflexa*, *Brachiaria lata*, *Commelina benghalensis*, *Commelina forskalaei*, *Cyperus rotundus*, *Dactyloctenium aegyptium*, *Digitaria horizontalis*, *Eleusine indica*, *Eragrostis aspera*, *Fimbristylis hispidula*, *Kyllinga squamulata*, *Paspalum scrobiculatum*, *Setaria pallide-fusca*.

EXEMPLES :

Dicotylédones



Corchorus tridens



Hibiscus asper



Ipomoea eriocarpa



Ludwigia abyssinica

Monocotylédones



Brachiaria spp.



Eragrostis spp.

MODE D'ACTION

RAMSES contient 30g/l de rimsulfuron, matière active de la famille des sulfonylurées, groupe HRAC-2.

Absorbé principalement par les feuilles mais également par les racines, **RAMSES** est doté de propriétés systémiques et est véhiculé par le phloème et le xylème. Il bloque la synthèse des acides aminés essentiels à la division cellulaire et à la croissance des adventices ce qui provoque un arrêt de croissance immédiat. **RAMSES** induit des jaunissements ou rougissements qui se transforment en nécroses et provoquent ainsi la disparition progressive des adventices.

Les symptômes apparaissent 8-10j après l'application.

MODE D'EMPLOI

Culture	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Maïs	0.5 l/ha	Traiter en post-levée de la culture et des adventices, 15-25 jours après levée.	60j	6h

Soit une quantité de 25ml de **RAMSES** dans 15l d'eau pour un volume de bouillie de 300l/ha.

Conseils d'utilisation : En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat de **RAMSES** et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

Autres conseils : Le traitement en post semis – prélevée doit être effectué le jour du semis ou dans les 24-48h maximum.

Nettoyage du matériel après pulvérisation : il est important de bien nettoyer le matériel utilisé à l'aide d'une solution d'eau de javel à 12° du commerce par exemple (0.25 l pour 100 l d'eau) ou d'une solution d'ammoniaque à 3% (1 l pour 100 l d'eau) afin d'éliminer toutes les traces de produit susceptibles de provoquer des dégâts aux cultures au cours de l'utilisation suivante.

Stockage : Le produit est stable et se conserve dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie). Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

Précautions : Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement et l'utilisation du produit sont à suivre, selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages.



Vos cultures ont droit au meilleur !



Flashez ce QR code
pour en savoir plus
sur nos produits