

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	TRIPA 250 EC
<i>Type de formulation</i>	EC – Emulsion concentrée
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Triadimenol 250 g/l
<i>Usage</i>	Fongicide

TRIPA 250 EC est un fongicide à large spectre pour lutter contre les maladies des cultures maraîchères et fruitières, des céréales et contre le fomès de l'hévéa.

MODE D'ACTION

TRIPA 250 EC contient 250 g/l de triadimenol, matière active de la famille des triazoles, groupe FRAC-3.

TRIPA 250 EC, fongicide systémique, agit par contact sur de nombreux champignons pathogènes et possède une triple action préventive, curative et éradicante.

TRIPA 250 EC exerce son action en inhibant la biosynthèse de l'ergostérol mais aussi en inhibant la synthèse des gibbérellines ce qui lui confère un effet stimulant sur la végétation.

Ses propriétés systémiques lui donnent une très bonne résistance au lessivage ainsi qu'une longue persistance d'action (10j).

MODALITES D'EMPLOI

Principales cibles visées

TRIPA 250 EC a un très large spectre et est efficace sur de nombreux champignons pathogènes. On peut l'employer sur cultures maraîchères, fruitières, vivrières et contre le fomès de l'hévéa.

Stratégies conseillées

La dose préconisée varie de 0.2 à 0.4 litre par hectare selon les cultures, à adapter en fonction des conditions locales.

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Choux	Oïdium, Rouille, Cladosporiose, Septoriose, Rhynchosporiose	0.4 l/ha	Traiter dès les premiers risques d'attaque avec répétitions à intervalle de 7 à 10 jours. 4 appl. Max.	7j	24h
Cucurbitacées, Solanacées					
Banane	Cercosporiose		Traiter dès les premiers risques d'attaque avec répétitions à intervalle de 14 jours. 3 appl. Max.	15j	
Cultures fruitières	Oïdium, Rouille, Moniliose	0.2 l/ha			
Hévéa	Fomès	2 ml/plt	Pour chaque arbre autour du foyer, appliquer une solution contenant 2ml de produit dans 2l d'eau.	n/a	n/a
Canne à sucre	Charbon nu, Pourriture noire	100ml/100l	Trempage des boutures dans une solution à 0.1%.		

Traitement de base :

TRIPA 250 EC s'utilise en pulvérisation foliaire classique. Remplir la cuve du pulvérisateur à moitié puis ajouter la dose adéquate de TRIPA 250 EC, bien remuer, puis compléter le volume restant avec de l'eau.

Précautions

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de TRIPA 250 EC selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau

Ne pas avaler ou respirer le produit.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Mesure de première urgence

Inhalation : Faire respirer de l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène.

En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau claire. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes y compris sous les paupières. Consulter d'urgence un médecin si l'irritation persiste.

Ingestion : Rincer la bouche. Faire boire 1-2 verres d'eau si la victime est consciente. NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.

Antidote et équivalents

Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique.