

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

<i>Nom</i>	VIZIR C 94 EC
<i>Type de formulation</i>	EC – Emulsion Concentrée
<i>Nom et teneur des matières actives</i>	Cypermethrine : 72 g/l Abamectin: 22 g/l
<i>Usage</i>	Insecticide-Acaricide

VIZIR C 94 EC est une formulation prête à l'emploi pour le traitement par pulvérisation foliaire des cotonniers.

VIZIR C 94 EC : une réponse adaptée aux exigences des filières

- Efficacité : contient une nouvelle matière active acaricide avec nouveau mode d'action, efficace même sur les souches d'acariens résistantes aux organophosphorés

MODE D'ACTION

VIZIR C 94 EC contient 72g/l de cypermethrin et 22g/l d'abamectin. Il s'agit d'un insecticide-acaricide comprenant un pyrethrine (groupe IRAC-3a) et une avermectine (groupe IRAC-6).

VIZIR C 94 EC est un insecticide-acaricide foliaire qui peut être utilisé en préventif ou en curatif.

L'abamectine agit par ingestion et dans une moindre mesure par contact sur les larves et les adultes. Ses propriétés translaminaires lui confèrent une efficacité accrue sur l'ensemble des ravageurs cibles (y compris ceux situés sous les feuilles), une grande persistance d'action (de l'ordre de 3-6 semaines) ainsi qu'une très bonne résistance au lessivage. Par ailleurs, l'abamectine possède un mode d'action unique sur les arthropodes : il agit comme antagoniste d'un neuromédiateur (GABA), d'où l'absence de résistance croisée avec les autres insecticides et acaricides. L'action sur le système nerveux entraîne une paralysie des insectes, notamment des acariens, conduisant à un arrêt de l'alimentation et ainsi à un arrêt immédiat des dégâts.

La cyperméthrine, agit par contact et ingestion sur un grand nombre d'insectes. Elle possède également un effet répulsif qui entraîne l'inhibition de la ponte chez les adultes et bloque la prise de nourriture chez les larves.

MODALITES D'EMPLOI

Objectifs

La protection phytosanitaire des cotonniers est importante pour obtenir un niveau de rendement satisfaisant car ils sont particulièrement attractifs pour les agents pathogènes et insectes parasites.

Principales cibles visées

VIZIR C 94 EC permet de lutter efficacement contre les chenilles carpophages (y compris endocarpiques) et phyllophages, les acariens et de nombreux insectes (thrips, mouches mineuses, psylles...). VIZIR C 94 EC peut être utilisé sur cotonnier.

Stratégies conseillées

La dose préconisée est de 0.5l/ha.

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Coton	Chenilles carpophages Chenilles phyllophages, Acariens	0.5L/ha	Traiter dès les 1ères infestations, ou selon les recommandations techniques locales.	14j	24h

Traitement de base :

En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat d'VIZIR C 94 EC et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

Précautions

Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement, l'utilisation de VIZIR C 94 EC selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages sont à suivre.

AUTRES INFORMATIONS

Stabilité à l'entreposage

Stable dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie) pour un minimum de 2 ans. Conserver le récipient bien fermé.

Mesures de sécurité

Précautions à prendre

Eviter tout contact avec les yeux et la peau

Ne pas avaler ou respirer le produit.

Stocker le produit dans son emballage d'origine, éloigné des denrées stockées et hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer lors de la manipulation du produit et lors de son application.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Après le traitement, changer de vêtements et se laver.

Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des produits autres qu'à usage phytopharmaceutique.

Rincer l'appareillage avant et immédiatement après usage.

Porter des gants, des vêtements de protection appropriés et une protection du visage et des yeux lors de la manipulation du produit concentré.

Mesure de première urgence

Inhalation : Faire respirer de l'air frais. En cas de respiration difficile ou d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle. Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. Consulter immédiatement un médecin.

Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver immédiatement et abondamment à l'eau claire les parties exposées de la peau. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation persiste. Laver les vêtements avant réutilisation.

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau y compris sous les paupières. Consulter d'urgence un médecin.

Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin.

Antidote et équivalents

Ce matériel peut provoquer des activités GABA chez les animaux. Il est déconseillé d'utiliser des médicaments pouvant provoquer des activités GABA chez des patients pouvant être en contact avec de l'abamectine.

La toxicité peut être réduite par l'administration de substances absorbantes (Charbon activé).

Si la toxicité par exposition provoque des vomissements importants, l'étendue du liquide et de l'électrolyte devrait être calculée.