

savana
SEMENCES



EQUATOR F1

Tomate hybride

***EQUATOR F1** est une tomate hybride à fort potentiel de rendement. Elle se caractérise par sa capacité à résister à de nombreuses maladies et à la chaleur dans divers environnements.*

Très productive

Très résistante

Adaptée à la saison des pluies comme à la saison sèche

DESCRIPTION :

Type de plante : Déterminé

Couleur du fruit : Rouge

Forme du fruit : Allongé/Arrondi

Taille du fruit : 110-120 g

COMPORTEMENT :

Repiquage - Récolte : 20-25 jr

Cycle de culture: 130 jr

Tolérance : Flétrissement
bactérien et TYLCV

RENDEMENT :

Rendement : 15-20 Kg/Plante

40-60 t/ha



Semence



Semence

EQUATOR F1

Tomate hybride

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

PREPARATION DU SOL

Les sols bien drainés seront les plus favorables. Si le sol est trop acide, ajouter des engrais à base de magnésium ou de calcium, comme de la chaux. Préparer soigneusement le lit de semences pour favoriser une bonne levée homogène.

SEMIS

Traitez les semences avec du **MOMTAZ** avant semis pour prévenir les maladies. Semez ensuite les graines dans une pépinière à l'abri de la pluie et des insectes. Après 20 à 25 jours, repiquez les plants en respectant un écartement en fonction de la saison ou de l'irrigation.

Saison	Ecartement entre pied	Ecartement entre ligne	Nombre de plant/ha
Saison des pluies (non irrigué)	60 cm	75 cm	22 000 plants/ha
Saison sèche (non irrigué)	45 cm	75 cm	30 000 plants/ha
Irrigué	50 cm	50 cm	40 000 plants/ha

FERTILISATION

Adapter la fertilisation à votre objectif de rendement. Espacer les apports d'engrais. Apporter avant repiquage du **BIOSOL/MYCOSOL** accompagné de 1 à 2 t/ha de fumure organique. Dès la floraison appliquer chaque 15 jour du **FOLIGA/SMARTFOIL**.

Mode de fertilisation	Fréquence d'application depuis le repiquage	Dose d'application Urée 46N Par plant	Dose d'application NPK Par plant	Objectif de rendement
Classique	20 jr	2,5 g 1 bouchon	7,5 g 3 bouchons	30-35 T
Expert	10 jr	5 g 2 bouchons	15 g 6 bouchons	40-60 T

PROTECTION SANITAIRE

Préparer la parcelle avant le semis avec un herbicide total. Pour lutter contre les maladies fongiques, appliquez un fongicide de contact chaque semaine. Si la maladie persiste, utilisez un fongicide systémique. Dès l'apparition des premières chenilles, appliquez un insecticide spécifique pour les contrôler. Les tomates sont sujettes aux attaques de nématodes, appliquez des nématicides.

