

savana
SEMENCES



FARIMA F1

Piment hybride

***FARIMA F1** est un piment de type habanero jaune. Il se caractérise par une plante très vigoureuse, des fruits homogènes de gros calibres, et une excellente résistance aux maladies. Son fruit vire du vert foncé au jaune.*

Très productif / Longue durée de production

Bon feuillage / Excellente résistance aux maladies

Fruits uniformes et aromatiques

DESCRIPTION :

Type de fruit : Habanero
Forme du fruit : Lanterne
Dimension fruit : 5x3 cm
Poids fruit : 20-22 g
Couleur du fruit : Vert foncé à jaune doré
Arôme : intense
Scolville : 200-425 000 (Toride)

COMPORTEMENT :

Repiquage - Récolte : 25-28 jr
Premiers fruits 75-80 jr
Cycle de culture: 140 jr
Tolérance : Viroses (TYLCV & YVMV)

RENDEMENT :

Rendement : 4-6 Kg/plante



Semence

FARIMA F1

Piment hybride

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

PREPARATION DU SOL

Les sols bien drainés seront les plus favorables. Si le sol est trop acide, ajouter des engrais à base de magnésium ou de calcium, comme de la chaux. Préparer soigneusement le lit de semences pour favoriser une bonne levée homogène.

SEMIS

Traitez les semences avec du **MOMTAZ** avant semis pour prévenir les maladies. Semez ensuite les graines dans une pépinière à l'abri de la pluie et des insectes. Prévoyez 170 à 190 g de semences/ha. Après 25 à 28 jours, repiquez les plants en respectant un écartement en fonction de la saison ou de l'irrigation.

Saison	Ecartement entre pied	Ecartement entre ligne	Nombre de plant/ha
Saison des pluies	50 cm	100 cm	20 000 plants/ha
Saison sèche (non irrigué)	50 cm	85 cm	23 500 plants/ha
Saison sèche (irrigué)	45 cm	80 cm	26 600 plants/ha

FERTILISATION

Adapter la fertilisation à votre objectif de rendement. Espacer les apports d'engrais. Apporter avant repiquage du **BIOSOL/MYCOSOL** accompagné de 1 à 2 t/ha de fumure organique. Dès la floraison appliquer chaque 15 jour du **FOLIGA/SMARTFOIL**.

Mode de fertilisation	Dose d'application Urée 46N Par plant	Dose d'application NPK Par plant	Dose d'application FOLIGIA P Par plant
Repiquage à Floraison	7,5 g 3 bouchons/plant	7,5 g 3 bouchons/plant	
Floraison à première fructification		15 g 6 bouchons/plant	2L/ha 2 applications à 15 jr d'intervall
Fructification à Fin récolte		7,5 g 3 bouchons/plant	2L/ha 2 applications à 15 jr d'intervall

PROTECTION SANITAIRE

Préparer la parcelle avant le semis avec un herbicide total. Pour lutter contre les maladies fongiques, appliquez un fongicide de contact chaque semaine. Si la maladie persiste, utilisez un fongicide systémique. Dès l'apparition des premiers insectes, appliquez un insecticide spécifique pour les contrôler. Les insectes sont porteurs de virus qui risquent d'impacter négativement le rendement. Les piments sont sujets aux attaques de nématodes, appliquer des nématicides.

